FOCUS

VOTRE CHIEN A MANGÉ QUOI ?

La décontamination : quand et comment

Rédigé par :

Dre Valérie Sauvé, m.v., Dipl. ACVECC

Soins intensifs

INTRODUCTION

L'ingestion accidentelle de produits de toutes sortes est une raison d'appel ou de présentation quotidienne dans les cliniques vétérinaires. En général, les premières directives devraient être de prévenir plus d'exposition et de ne pas donner de remède maison sans l'avis direct d'un vétérinaire ou d'un centre antipoison. Toujours demander au client d'amener le contenant original du produit ingéré. Une consultation avec un vétérinaire devrait être recommandée pour une évaluation appropriée des risques de problèmes plutôt que des conseils téléphoniques. Les calculs de doses toxiques au téléphone sont risqués puisque des erreurs sont faciles et peuvent avoir des conséquences graves.

Anamnèse

- La nature exacte du produit ainsi que sa quantité seront très utiles.
- L'heure d'ingestion
- Si des symptômes sont notés
- Les antécédents médicaux et maladies concomitantes devront aussi être considérés dans l'élaboration du plan de traitement.

Triage

- Évaluation rapide et stabilisation des systèmes vitaux :
  Respiration, cardiovasculaire, neurologique et rénal

QUAND INDUIRE LE VOMISSEMENT ?

- Patient asymptomatique avec ingestion <1-2 h
- Patient asymptomatique lorsque l'on est incertain de l'heure d'ingestion
- Lorsque l'on sait que le produit ingéré peut rester longtemps dans l'estomac : raisins, gommes, chocolat, xylitol, ingestion en grande quantité.

Ne pas induire le vomissement lorsque :

- Des produits corrosifs ont été ingérés : eau de javel, batteries, produits nettoyants, etc.
- Des produits d'hydrocarbures ont été ingérés : gazoline, huile, etc.
- Le patient est symptomatique, par exemple si tremblements, faiblesse, convulsion, agitation, etc.
- Le patient est particulièrement à risque de pneumonie par aspiration ou autres complications selon les antécédents médicaux
- Chez le chat, la décontamination est plus risquée et le risque vs les bénéfices des interventions doit être pesé pour chaque cas individuellement.

COMMENT DÉCONTAMINER ?

Chez le chien :

Il est toujours préférable que l'animal soit vu en clinique pour une évaluation adéquate de la situation. Cependant, dans certaines situations particulières, le vomissement pourrait être induit avec du peroxyde d'hydrogène à la maison. Le peroxyde a cependant été associé avec des érosions digestives sévères (œsophagites/gastrites). Il est préférable de l'éviter, personnellement je ne le recommande pas. Seulement le peroxyde 3 % peut être utilisé.

- 1 c à t./2.5 kg (1-2 ml/kg), peut être répété une fois

Apomorphine dans le sac conjonctival, bien rincer l'œil après le premier épisode de vomissement

- Petit chien ½ / grand chien 1 comprimé (6.25mg)

Chez le chat :

Il n'y a pas de façon sécuritaire de faire vomir un chat à la maison. Il est toujours recommandé de consulter en clinique ou au service d'urgence après ingestion d'un produit toxique.

Dexmedetomidine, efficace en moyenne en 5 minutes, puis administrer atipamezole à volume égal

- 7 µg/kg IM

Le lavage gastrique est rarement accompli puisqu'un cathéter IV, une anesthésie générale et intubation endo-trachéale sont requis. Si une grande quantité de matériel toxique persiste dans l'estomac après les vomissements, ou que le produit ingéré est très toxique, e.g. baclofen, strychnine, etc. ceci devrait toutefois être considéré.



Charbon activé

- Indiquée pour certaines ingestions seulement chez les patients asymptomatiques et doit parfois être répété
- L'utilisation de cathartique (sorbitol) est recommandée seulement lors de la première dose de charbon activé et devrait être évitée chez les patients : déshydratés, polyuriques, avec diarrhée, etc.
- Possible hypernatrémie, éviter haute dose
- 1 à 5 G /kg puis 1-2 g/kg pour les doses subséquentes q4-6 h pour 24 h

Autres traitements de support

- Selon le processus d'élimination et de métabolisme, des fluides intraveineux pourraient favoriser l'excrétion urinaire
- Antidote et traitements spécifiques
- Monitoring
- Administration de lipides intraveineux

En cas de doute, contactez : ASPCA Animal Poison Control Center

1-888-426-4435 (65 $ US /consultation)

Il y a une application !! : APCC by ASPCA