

Le cancer de la rate chez le chien



Une tumeur difficile à diagnostiquer à temps.



Le cancer de la rate le plus fréquent est l'hémangiosarcome, un cancer des vaisseaux sanguins de la rate. Les chiens de grandes races (Labrador, Golden retriever, Berger allemand...) sont les plus souvent atteints. L'évolution du cancer est insidieuse mais rapide et la présentation clinique du problème est souvent aiguë et dramatique. Celle-ci est habituellement causée par une hémorragie interne causée par la rupture de la masse au niveau de la rate. La rate étant un réservoir de globule rouge, un saignement de celle-ci amène une anémie sévère. Cette anémie est associée aux signes cliniques typiques des chiens présentés à l'urgence : faiblesse, fatigue, choc hypovolémique, gencives pâles et respiration rapide.

Parfois, l'abdomen peut sembler distendu vu la présence de sang dans celui-ci. Parfois, des chiens ayant une échographie de l'abdomen se voient diagnostiqués plus tôt, avant que la masse ne saigne. Le traitement consiste en la splénectomie (excision de la rate) suivie d'un traitement adjuvant à base de petites doses de chimiothérapie et nouvelles molécules contre le cancer. Le but étant de donner la meilleure qualité de vie possible pour plusieurs mois. Malheureusement, la majorité des chiens succombe éventuellement des métastases aux poumons ou au foie



En collaboration avec Laurence Santerre, TSA certifiée Dipl. AIMVT